

NE#	Naturtyper	På kort sigt: Tiltag	Prioritet	På lang sigt: Tiltag	Prioritet	Natur værdi	Beskyttet ifølge lovgivning	Bemærkninger
60	Park	Bænke, informationstavler	Høj	Etablering af markante træer	Middel	Høj	Vides ikke	
61	Mindesmærke	Informationstavle	Middel	Ingen	Ingen	Middel	Vides ikke	
62	Stengærde	Slåning af nælder m.v.	Middel	Slåning af nælder, rydning af buske	Middel	Meget høj	Ja	
63	Læhegn	Ingen	Lav	Ingen	Lav	Lav	Nej	Næsten nyplantet
64	Læhegn	Ingen	Lav	Ingen	Lav	Lav	Nej	Nyplantet øst for nordlig vindmølle. Ikke behandet nærmere i teksten.

Bilag 8: Floraliste for Svanholm

Denne floraliste omfatter de arter af blomsterplanter der er observeret ved feltarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af naturplanen for Svanholm i 2004. Desuden er medtaget enkelte mosser og laver. Særlige forekomster er mærket med en stjerne (*). Sjældne forekomster er mærket med to stjerner (**).

Listen omfatter 309 arter af blomsterplanter. Der er kun medtaget arter, der forekommer vildt eller forvildet. Egentlige haveplanter, som næppe er i stand til at producere spiringsdygtige frø, er ikke medtaget.

Karplanter:

Andemad, Kors- (*Lemna trisulca*): i de større søer og moser.

Andemad, Liden (*Lemna minor*): m.alm. i søer og moser.

Andemad, Tyk (*Lemna gibba*)*. Menes iagttaget i skovsøen naturelement 2 i Julianehøj Skov.

Anemone, Gul (*Anemone ranunculoides*): udplantet enkelte steder mod øst i Julianehøj Skov og Svanholm Parkskov.

Anemone, Hvid (*Anemone nemoralis*): Udplantet mod øst i Julianehøj Skov, hvor den breder sig. Desuden i den østlige del af Krogstrup skov og Saltsø Skov. Også udplantet i Svanholm Parkskov.

Arum, Plettet (*Arum maculatum*): udplantet, naturaliseret og bredende sig kraftigt mod øst i Julianehøj Skov samt i Svanholm Parkskov.

Ask (*Fraxinus excelsior*): alm. som opvækst, næppe plantet.

Asp, Bævre- (*Populus tremula*): Krogstrup Skov m.v.

Baldrian, Tvebo (*Valeriana dioica*)*: Ret sparsom i Venslev Mose.

Bellis, Tusindfryd (*Bellis perennis*): m. alm.

Birk, Vorte- (*Betula pendula*): Almindelig vild og plantet

Blærerod (*Utricularia*)**: en ubestemt art blærerod i søen i tørvemosen ved naturelement 35.

Blåhat (*Knautia arvensis*): hist og her langs veje og i stabil græsvegetation.

Borst, Høst- (*Leontodon autumnalis*): m. alm. i stabil græsvegetation, langs veje, i plæner.

Brandbæger, Almindelig (*Senecio vulgaris*): Almindeligt ukrudt.

Brandbæger, Eng- (*Senecio jacobaea*): hist og her i græsvegetation, men ikke særlig hyppig på Svanholm.

Brandbæger, Vår- (*Senecio vernalis*): efterhånden almindeligt ukrudt i Danmark, men sparsom på Svanholm: brakjord, yngre græsmarker, nyplantninger, etc. Især på mere sandet jord.

Brombær, Almindelig (*Rubus plicatus*): set i hvert fald i Krogstrup Skov.

Brombær, Armensk (*Rubus armeniacus*): almindelig forvildet art.

Brombær, Ru (*Rubus radula*): flere steder i skov og krat.

Brunelle, Almindelig (*Prunella vulgaris*): M. alm. i græsvegetation, langs veje og stier etc.

Brunrod, Knoldet (*Schrophularia nodosa*): set et par steder i ung skov.

Brøndsel, Fliget (*Bidens tripartita*): almindeligt ukrudt på vandmættet agerjord.

Bukketorn, Almindelig (*Lycium barbarum*): plantet nogle steder i hegn, og måske forvildet derfra.

Bunke, Bølget (*Deschampsia flexuosa*): Kun sparsom i kanten af granplantning øst for Julianehøj Skov og i Saltsø Skov.

Bunke, Mose- (*Deschampsia caespitosa*): M.alm., især på lidt fugtig udyrket bund.

Burre, Filtet (*Arctium tomentosum*): ukrudt på næringsrige steder ved veje og stengærder.

Bøg (*Fagus sylvatica*)

Cikorie (*Cichorium intybus*): hist og her langs veje.

Druemunke (*Actaea spicata*)*: Få eksemplarer i lille bestand i Julianehøj Skov.

Dueurt, Kær- (*Epilobium palustre*): Venslev Mose

Dueurt, Lodden (*Epilobium hirsutum*): alm. på ugræssede engarealer m.v.

Dunhammer, Bredbladet (*Typha latifolia*): m.alm. og bestanddannende i især næringsrige vådområder.

Dunhammer, Smalbladet (*Typha angustifolia*): stedvis almindelig og bestanddannende, danner f.eks. limnisk (vanddækket) rørsump i store dele af Venslev Mose.

Døvnælde (*Lamium album*): almindelig på næringsrige steder nær haver, i skov og krat.

Eg, Stilk- (*Quercus robur*)

El, Grå- (*Alnus incana*): plantet i hegn, og ret sjældent forvildet.

El, Rød- (*Alnus glutinosa*): plantet og forvildet og vildtvoksende ved Saltsø m.v.

Elm, Skov- (*Ulmus glabra*): alm.

Engelsød, Storbladet (*Polypodium enterjectum*): talrig på stengærderet naturelement 62 mod NV på Svanholm.

Eranthis (*Eranthis hyemalis*): hyppigt forvildet nær bygninger og haver.

Evighedsblomst, Sump- (*Gnaphalium uliginosum*): få steder på vandlidende jord.

Fingerbøl, Almindelig (*Digitalis purpurea*)*: set i Saltsø Skov og Venslev Mose.

Fladbælg, Gul (*Lathyrus pratensis*)

Fladstjerne, Græsbladet (*Stellaria graminea*): m.alm. i græsvegetation.

Fladstjerne, Kær- (*Stellaria palustris*): Venslev Mose, Saltsø m.v.

Fladstjerne, Stor (*Stellaria holostea*): i Krogstrup Skov og Saltsø Skov.

Fladstjerne, Sydlig Lund- (*Stellaria nemorum* ssp. *glochidisperma*): en mindre bevoksning på 3-4 m² midt-nordligt i Julianehøj Skov.

Flitteraks, Enblomstret (*Melica uniflora*): hist og her, under udbredelse i skovene.

Forglemmigej, Eng- (*Myosotis scorpioides* var. *scorpioides*): Almindelig på fugtig engjord, i moser, ved søbredder etc.

Forglemmigej, Mark- (*Myosotis arvensis*): hyppig langs markkanter, vejkanter, i græsvegetation etc.

Forglemmigej, Skov- (*Myosotis sylvatica*): bemærket flere steder. Arten er under udbredelse som forvildet fra dyrkning i haver og på gartnerier, men forekommer også oprindeligt i næringsrige skove.

Fredløs, Almindelig (*Lysimachia vulgaris*) hyppig ved vådområder.

Fredløs, Dusk- (*Lysimachia thyrsoiflora*): alm. ved fattigkæret ved naturelement 35.

Fredløs, Pengebladet (*Lysimachia nummularia*): hist og her i græsplæner, langs veje etc.

Fuglegræs, Almindelig (*Stellaria neglecta*): m.alm.

Fuglegræs, Bleg (*Stellaria pallida*)*: menes set ved skovvej i Julianehøj Skov.

Fyr, Skov- (*Pinus sylvestris*): opvækst ses hist og her i Krogstrup Skov.

Følfod (*Tusillago farfara*): især på lerjord, ikke hyppig på Svanholm.

Galtetand, Kær- (*Stachys palustris*): ukrudt på vandlidende agerjord et par steder.

Galtetand, Skov- (*Stachys sylvatica*): bemærket et par steder i skove og langs veje og stier.

Gedeblad, Almindelig (*Lonicera periclymenum*): ret få forekomster i skovene.

Gedeblad, Dunet (*Lonicera xylosteum*): plantet i haver, og hist og her forvildet i skovene, næppe oprindeligt vild i området.

Gedeskæg, Småkronet- (*Tragopogon pratensis* ssp. *minor*.): set et par steder ved vejkanter og stengærder.

Gemserod, Hjertebladet (*Doronicum pardalianches*): forvildet et par steder.

Gråbynke, Almindelig (*Artemisia vulgaris* ssp. *vulgaris*): almindligt ukrudt.

Guldnælde, Have- (*Lamium galeobdolon* ssp. *argentatum*): forvildet fra dyrkning i haver i skov og krat flere steder.

Guldstjerne, Almindelig (*Gagea lutea*): ret sparsom i Julianehøj Skov.

Guldstjerne, Liden (*Gagea minima*)*: En bestand dækkende 4-5 m² midt nordligt i Julianehøj Skov.

Gulerod, Vild (*Daucus carota* ssp. *carota*): alm. ved vejkanter, i græsvegetation, på skrænter etc.

Gyldenris, Sildig (*Solidago gigantea*): hist og her forvildet, men næppe noget problem som landskabsukrudt på Svanholm.

Gåsefod, Hvidmelet (*Chenopodium album*): m. alm. ukrudt

Gåsemad, Almindelig (*Arabidopsis thaliana*)

Hanekro, Almindelig (*Galeopsis tetrahit*): ukrudt i markkanter, ved hegn og krat etc.

Haremad, Almindelig (*Lapsana communis* ssp. *communis*): Meget almindelig i skov, også almindelig som markukrudt.

Hassel (*Corylus avellana*): almindelig i skov og krat.

Hasselbrombær (*Rubus* Sekt. *corylifolia*): Almindelig i krat og hegn

Hejre, Blød (*Bromus hordeaceus* ssp. *hordeaceus*): M.alm.

Hejre, Gold (*Bromus sterilis*): ikke særlig almindelig ukrudtsplante langs veje etc.

Hejrenæb (*Erodium cicutarium*): En hyppig ukrudtsplante på let jord, langs veje etc.

Hindbær (*Rubus idaeus*): alm. i skov og krat.

Hjortetrøst (*Eupatorium cannabinum*): Hist og her ved moser, især skovmoser.

Honningurt (*Phacelia tanacetifolia*): forekommer sparsomt et par steder, vel som rester fra tidligere udsåninger.

Hornblad, Tornfrøet (*Ceratophyllum demersum*): Sø i vestlige del af Venslev Mose.

Hulsvøb, Almindelig (*Chaerophyllum temulum*): alm. i skov og krat, som ukrudt etc.

Humle, Almindelig (*Humulus lupulus*): hist og her forvildet og evt. vild.

Hundegræs, Almindelig (*Dactylis glomerata*): M.alm.

Hundegræs, Skov- (*Dactylis glomerata* ssp. *lobata*)*: Ret sparsom mod vest i løvskovspartierne i Krogstrup Skov.

Hundepersille (*Aetusa cynapium*): alm. på næringsrige steder.

Hvene, Almindelig (*Agrostis tenuis*): M.alm.

Hvene, Hunde- (*Agrostis canina*)*: sparsom på overdrevspartier i Venslev Mose.

Hvene, Kryb- (*Agrostis stolonifera* var. *stolonifera*): M.alm.

Hvene, Stortoppet (*Agrostis gigantea*): alm, f.eks. på brakjord og i kanten af moser og enge m.v.

Hvidtjørn, Engriflet (*Crataegus monogyna*): m.alm.

Hyld, Almindelig (*Sambucus nigra*): almindelig

Hyld, Drue- (*Sambucus racemosa* var. *racemosa*): enkelte steder i skovene, muligvis plantet i hegn.

Hæg, Almindelig (*Prunus padus*): sparsom i skove og moser.

Hæg, Glansbladet (*Prunus serotina*): sparsom i læhegn (plantet og sjældent selvsået).

Høgeskæg, Grøn (*Crepis capillaris*): markukrudt, mest på mere leret og næringsrig jord.

Høgeskæg, Tag- (*Crepis tectorum*): almindeligt markukrudt på Svanholms lette jord.

Høgeurt, Håret (*Pilosella officinarum* ssp. *officinarum*): kun bemærket i Venslev Mose.

Iris, Gul (*Iris pseudachorus*): i de større moser: Venslev Mose, Saltsø m.v.

Jordbær, Skov- (*Fragaria vesca*): alm. i skovkanter etc.

Jordrøg, Læge (*Fumaria officinalis*)

Judaspenge (*Lunaria annua*): bemærket som forvildet enkelte steder nær huse.

Kabbeleje, Eng- (*Caltha palustris* ssp. *palustris*):

Kamille, Lugtløs (*Tripleurospermum perforatum*): almindligt ukrudt, men ikke særligt dominerende på Svanholm

Karse, Eng (*Cardamine pratensis*)

Kartebolle, Gærde- (*Dipsacus fullonum*): set i få eksemplarer ved gruspladser og langs veje.

Katost, Almindelig (*Malva sylvestris*): hyppig

Kattehale (*Lytrum salicaria*): hist og her i moserne.

Kirsebær, Fugle- (*Prunus avium*): hist og her

Klaseskærm, Billebo- (*Oenanthe aquatica*)*: kun ved naturelement 18.

Klokke, Ensidedig (*Campanula rapunculoides*): forvildet i skov og krat, især nær bebyggelser

Klokke, Liden (*Campanula rotundifolia* ssp. *rotundifolia*): hist og her i overdrevsagtig vegetation, langs veje etc., f.eks. ved Venslev Mose.

Kløver, Alsike- (*Trifolium hybridum* ssp. *hybridum*)

Kløver, Bugtet (*Trifolium medium*): Venslev Mose m.v.

Kløver, Fin (*Trifolium dubium*)

Kløver, Gul (*Trifolium campestre*)

Kløver, Hare- (*Trifolium arvense*): sparsom

Kløver, Hvid (*Trifolium repens*)

Kløver, Rød (*Trifolium pratense* var. *pratense*)
 Knopurt, Almindelig (*Centaurea jacea*): få steder ved vejkanter o.l.
 Knopurt, Bjerg- (*Centaurea montana*): få steder nær bebyggelse, forvildet fra dyrkning.
 Knopurt, Stor (*Centaurea scabiosa*): få steder ved tørre vejkanter o. l.
 Kongelys, Filtbladet (*Verbascum thapsus*)*: randarealer m.v. i Krogstrup Skov
 Kongelys, Uldbladet (*Verbascum densiflorum*)*: ret almindelig ved stengærder, markkanter m.v.
 Kongepen, Almindelig (*Hypochoeris radicata*): få steder i mager græsvegetation.
 Korbær (*Rubus caesius*): alm.
 Kornblomst (*Centaurea cyanus*): et sparsomt forekommende markukrudt på Svanholm.
 Kornel, Rød (*Cornus sanguinea*): plantet og forvildet
 Korsknep (*Glechoma hederacea*): almindelig på vandlidende agerjord, fugtige og næringsrige steder i skov og krat, i kanten af moser etc.
 Kragefod (*Potentilla palustris*): Kun i naturelement 35, hvor den er almindelig i hængesækken og "laggen" (randzonen).
 Krageklo, Mark (*Ononis repens* var. *repens*): hist og her ved vejkanter m.v.
 Krumhals (*Anchusa arvensis*): ukrudt bemærket få steder.
 Kulsukker, Foder (*Symphytum x ublandicum*): forvildet flere steder.
 Kvalkvæd, Almindelig (*Viburnum opulus*): hist og her i næringsrig skov, i gamle hegn etc.
 Kvik, Almindelig (*Elymus repens* var. *repens*): M. alm.
 Kvik, Hunde- (*Elymus caninus*): kun set sparsomt mod syd i Julianehøj Skov.
 Kællingetand, Almindelig (*Lotus corniculatus*)
 Kæruld, Smalbladet (*Eriophorum angustifolium* ssp. *angustifolium*): kun set i hængesækken på naturelement 35.
 Kæruld, Tue- (*Eriophorum vaginatum*)**: kun i hængesækken i naturelement 35, hvor den er almindelig.
 Kørvel, Vild (*Anthriscus sylvestris*): almindelig.
 Liguster (*Ligustrum vulgare*): hist og her forvildet i skov og krat.
 Lupin, Mangelbladet (*Lupinus polyphyllus*): udsået og forvildet flere steder.
 Løgekarse (*Alliaria petiolata*): m. alm.
 Mangeløv, Almindelig (*Dryopteris filix-mas*): ikke særlig almindelig i Svanholms skove.
 Mangeløv, Bredbladet (*Dryopteris dilatata*): kun få steder i skovene, især hvor der er lidt fugtigt.
 Mangeløv, Smalbladet (*Dryopteris carthusiana*): hist og her i skovene, en lysbladet form vokser i den indre dele af Venslev Mose.
 Markarve, Almindelig (*Arenaria serpyllifolia*): ukrudt på tørre, gerne sandede lokaliteter.
 Miliegræs (*Milium effusum*): Ret almindelig i ældre løvskov.
 Mirabel (*Prunus cerasifera*): M. alm. i læhegn, skov og krat.
 Mjødurt, Almindelig (*Filipendula ulmaria*)
 Mjødurt, Knoldet (*Filipendula vulgaris*)**: Sparsom på vestvendt stengærde ved Egebjerg.
 Mynte, Krans- (*Mentha x verticillata*): i de større moser.

Mælkebøtte (*Taraxacum*) under et; der er ikke skelnet mellem de mange småarter

Mærke, Bredbladet (*Sium latifolium*): alm. i fugtige moser (Venslev Mose, Saltsø m.v.)

Natlys, Toårig (*Oenothera biennis*)

Natskygge, Bittersød (*Solanum dulcamara* var. *dulcamara*): almindelig i moser og kær, undertiden ved markkanter etc.

Natskygge, Sort (*Solanum nigrum* ssp. *nigrum*): ukrudt på næringsrig jord.

Natviol (*Hesperis tristis*): bemærket som forvildet enkelte steder.

Nellikerod, Feber- (*Geum urbanum*): alm. i skov og krat.

Nælde, Stor (*Urtica dioica*)

Nælde, Stor (*Urtica dioica*): m. alm.

Oksetunge, Læge (*Anchusa officinalis*): Et ret hyppigt ukrudt på de lettere jorder på Svanholm, desuden i skovlysninger og langs veje.

Okseøjle, Hvid (*Leucantemum vulgare*): i græsvegetation, langs veje etc.

Padderok, Ager- (*Equisetum arvense*): alm. på vandlidende jord, også i skov

Padderok, Dynd- (*Equisetum fluviatile*): hyppig i de større moser.

Pastinak, Almindelig (*Pastinaca sativa* var. *sativa*): ukrudt hist og her, ikke særlig almindelig på Svanholm.

Peberrod (*Armoracia rusticana*): ret hyppigt forvildet

Pengeurt, Almindelig (*Thlaspi arvense*)

Perikon, Kantet (*Hypericum maculatum*)*: kun på overdrevsagtige partier ved Venslev Mose.

Perikon, Prikbladet (*Hypericum perforatum*): almindelig

Pil, Femhannet (*Salix pentandra*)

Pil, Grå- (*Salix cinerea* ssp. *cinerea*): Alm. moser m.v.

Pil, Selje – (*Salix caprea*): skovrydninger, lysninger, krat etc.

Pileurt, Almindelig (*Polygonum aviculare* ssp. *aequale*)

Pileurt, Bidende (*Persicaria hydropiper*)

Pileurt, Bleg (*Persicaria lapathifolia* ssp. *pallida*).

Pileurt, Japan- (*Fallopia japonica*). dyrket og forvildet nær haver etc., men sparsom.

Pileurt, Vand- (*Persicaria amphibia*): almindligt markukrudt på vandlidende grund og også som flydeplante i nogle af søerne.

Pileurt, Vej (*Polygonum aviculare* ssp. *aviculare*)

Pindsvineknop, Grenet (*Sparganium erectum*): spiller ikke nogen større rolle i vådområderne. Der er ikke sondret mellem underarterne.

Potentil, Gåse- (*Potentilla anserina*): alm. på fugtige enge etc.

Potentil, Krybende (*Potentilla reptans*)

Rajgræs, Almindelig (*Lolium perenne*): m.alm. i græsvegetation.

Randfrø, Hvas (*Torilis japonica*): almindelig i skov og krat hen på sommeren.

Ranunkel, Bidende (*Ranunculus acris* ssp. *acris*): Hyppig på enge, i skov og krat.

Ranunkel, Lav (*Ranunculus repens*): m. alm.

Ranunkel, Nedbøjet (*Ranunculus flammula*)

Ranunkel, Nyrebladet (*Ranunculus auricomus*): hist og her (opdelt i småarter).

Ranunkel, Storblomstret Vand- (*Ranunculus peltatus*): Vestlige del af Venslev Mose.

Rapgræs, Almindelig (*Poa trivialis*): m. alm.

Rapgræs, Eng- (*Poa pratensis* ssp. *pratensis*): alm.

Rapgræs, Enårig (*Poa annua*): almindeligt mark- og haveukrudt

Rapgræs, Fladstrået (*Poa compressa*): ved grusveje og pladser

Rapgræs, Stortoppet (*Poa palustris*)*: Ret hyppig på fugtigbundsarealer, f.eks. i Venslev mose.

Rejnfan, Almindelig (*Tanacetum vulgare* ssp. *vulgare*): ikke særligt udbredt på Svanholm, men f.eks. på lysåbne steder ved skovveje i Krogstrup Skov.

Rose, Glat Hunde- (*Rosa canina* ssp. *canina*): almindelig i skov og krat.

Rose, Rynket (*Rosa rugosa*): ret sparsom i krat og læghegn (plantet og forvildet).

Rottehale, Eng- (*Phleum pratense*): M.alm.

Rævehale, Eng- (*Alopecurus pratensis*): M.alm.

Rævehale, Gul (*Alopecurus aequalis*)**: Venslev Mose og Saltsø (mod vest)

Rævehale, Knæbøjet (*Alopecurus geniculatus* var. *geniculatus*) alm. på fugtig mark etc.

Rødknæ (*Rumex acetosella*)

Røllike, Almindelig (*Achillea millefolium* ssp. *millefolium*): m. alm. i græsvegetation.

Røn, Almindelig (*Sorbus aucuparia*)

Røn, Selje (*Sorbus intermedia*).

Rørhvene, Bjerg- (*Calamagrostis epigeios*): set et par steder i åben skov og langs veje. Ikke fremtrædende på Svanholm, og ikke noget problem som "landskabsukrudt".

Rørhvene, Eng- (*Calamagrostis canescens*): almindelig og bestanddannende i de større moser.

Rørhvene, Stivtoppet (*Calamagrostis stricta*): forekommer et par steder i Venslev Mose.

Salat, Tornet (*Lactuca serriola*): bemærket som markukrudt et par steder.

Singrøn, Liden (*Vinca minor*): forvildet nogle steder i skove, nær huse etc.

Siv, Glanskapslet: (*Juncus articulatus*): hyppig ved søbredder, på vandlidende jord langs veje, i hjulspor etc.

Siv, Lyse- (*Juncus effusus*): almindelig på enge, i moser etc.

Siv, Tudse- (*Juncus bufonius*): ret hyppigt ukrudt, især på vandlidende jord, i hjulspor etc.

Skabiose, Due- (*Scabiosa columbaria*)**: Fåtalig (10-15 planter) på vestvendt stengærde ved Egebjerg.

Skarntyde (*Conium maculatum*)**: Set ved stengærdet naturelement 10 på sydsiden af Julianehøj Skov.

Skeblad, Vejbred- (*Alisma plantago-aquatica*): hist og her ved søer og oversvømmelser.

Skilla, Russisk (*Scilla sibirica*) hist og her forvildet i krat og skov.

Skjolddrager (*Scutellaria gallericulata*): almindelig i de "gamle" moser: Saltsø, Venslev Mose, naturelement 35 o.s.v.

Skovarve (*Moehringia trinervia*): hist og her i skovene.

Skovmærke (*Geum odoratum*): I skovene, men ikke særlig udbredt.

Skovranke, Almindelig (*Clematis vitalba*): få steder forvildet.

Skovsalat (*Mycelis muralis*): ret hyppig i skovene, især langs vejkanter og i nyplantninger.

Skræppe, Butbladet (*Rumex obtusifolius*)

Skræppe, Kruset (*Rumex crispus*)

Skvalderkål (*Aegopodium podagraria*): m. alm.

Slåen (*Prunus spinosa*): Hist og her selvsået i læhegn og skovbryn.

Snerle, Ager- (*Convolvulus arvensis*): et almindeligt ukrudt ved veje og stier i agerlandet.

Snerle, Gærde- (*Calystegia sepium* ssp. *sepium*): Flere steder i rørskov ved moser, enkelte steder ved hegn etc.

Snerre, Bleggul (Gul x Hvid Snerre): (*Galium molluo* x *verum*): bemærket et par steder, sikkert ret almindelig.

Snerre, Burre- (*Galium aparine*): almindeligt ukrudt på næringsrige steder på agerjord, i skov og krat.

Snerre, Gul (*Galium verum*): i tør og overdrevsagtig græsvegetation, f.eks. ved Venslev Mose, på vejkanter etc.

Snerre, Hvid (*Galium mollugo*): almindelig.

Snerre, Kær- (*Galium palustre* ssp. *palustre*): Venslev Mose m.v.

Snerre, Sump- (*Galium uliginosum*): kun set ved Saltsø

Star, Blære- (*Carex vesicaria*): hist og her i moserne.

Star, Forlænget (*Carex elongata*)*: meget sparsom

Star, Håret (*Carex hirta*): hist og her både i moser og mere tørt ved vejkanter o.l.

Star, Knippe- (*Carex pseudocyperus*): alm. i og ved næringsrige søer og moser, ofte ret fugtigt.

Star, Næb- (*Carex rostrata*): hist og her, f.eks. i naturelement 35, Venslev Mose etc.

Star, Skov- (*Carex sylvatica*): Almindelig og under udbredelse i skovene.

Star, Stiv- (*Carex elata*): almindelig i og ved søer og moser.

Star, Top- (*Carex paniculata*): ret få tuer i Venslev Mose.

Star, Tråd- (*Carex lasiocarpa*)*: Talrig i hængesækken i fattigkæret i naturelement 35.

Star, Vår- (*Carex caryophylla*)**: kun sparsom et sted på tue på græsset eng vest for Svanholm Parkskov.

Stedmoder, Ager- (*Viola arvensis*): ukrudt

Stenkløver, Hvid (*Melilotus alba*): alm.

Stikkelsbær (*Ribes uva-crispa*): hist og her forvildet.

Storkenæb, Blød (*Geranium molle*): almindelig ukrudtsplante

Storkenæb, Kløftet (*Geranium dissectum*): en ret ualmindelig ukrudtsplante.

Storkenæb, Pyrenæisk (*Geranium pyrenaicum*): en ret hyppig ukrudtsplante langs vej- og skovkanter etc.

Storkenæb, Stinkende (*Geranium robertianum*): Almindelig i skov og krat.

Stregbælg, Blå (*Galega orientalis*): udsået flere steder, hvor den klarer sig ret godt og breder sig, f.eks. øst for Julianehøj Skov ved bikuber og fåreindhegning.

Sumpstrå, Almindelig (*Eleocharis palustris* spp. vulgaris): hyppig ved søbredder og i kanten af våd rørsump.

Svaleurt (*Chelidonium majus* var. majus): almindeligt forvildet i skov og krat.

Svinemælk, Ager- (*Sonchus oleraceus*): hyppigt markukrudt, også i rørskov.

Svinemælk, Almindelig (*Sonchus oleraceus*): almindeligt markukrudt.

Svinemælk, Ru- (*Sonchus asper*): markukrudt hist og her.

Svingel, Eng- (*Festuca pratensis*): Venslev mose m.v.

Svingel, Kæmpe- (*Festuca gigantea*): almindelig og under udbredelse i løvskovene.

Svingel, Rød- (*Festuca rubra* ssp. rubra): m. alm.

Svovlrød, Kær- (*Peucedanum palustre*): naturelement 35 og Venslev Mose

Sværtævæld (*Lycopus europaeus*): i moseområder: Venslev Mose, Saltsø o.s.v.

Syre, Almindelig (*Rumex acetosa* var. aecetosa): mest på tørre enge.

Syre, Dusk- (*Rumex thyrsiflora*): m. alm.

Syren, Almindelig (*Syringa vulgaris*): Almindelig plantet i hegn etc., og hist og her forvildet.

Sæbeurt, Almindelig (*Saponaria officinalis*)

Sødgræs, Høj (*Glyceria gigantea*): alm. og bestanddannende i moserne vest for Svanholm Parkskov.

Sødgræs, Manna- (*Glyceria fluitans*): alm. på fugtig, oversvømmet bund.

Sødskaerm (*Myrrhis odorata*): forvildet enkelte steder nær huse.

Tagrør (*Phragmites australis*): Alm. og bestanddannende i moserne.

Taks (*Taxus baccata*): Opvækst op til 1 meter ses, men sjældent.

Tandbæger, Rød (*Ballota nigra* ssp. nigra): almindelig på næringsrige steder nær bebyggelser, ved stengærder etc.

Tidsel, Ager (*Cirsium arvense*): almindeligt ukrudt.

Tidsel, Horse (*Cirsium vulgare*): almindeligt ukrudt.

Tidsel, Kruset (*Carduus crispus*): hyppigt ukrudt langs veje og markkanter, men ikke særligt fremtrædende på Svanholm.

Tidsel, Kær- (*Cirsium palustre*): ret få steder i moserne på Svanholm.

Tidsel, Kål- (*Cirsium oleraceum*): i højstaudevegetation på fugtig jord, men ikke særlig udbredt på Svanholm.

Tormentil (*Potentilla erecta*): sparsom på overdrev i Venslev Mose.

Torskemund, Almindelig (*Linaria vulgaris*): ret sparsom i græsvegetation, på stengærder m.v.

Tranebær (*Vaccinium oxycoccus* var. oxycoccus): Hyppig i hængesækken i 35.

Tvetand, , Fliget (*Lamium hybridum*): markukrudt, men kun set et par steder.

Tvetand, Liden (*Lamium amplexicaule*): almindeligt markukrudt.

Tvetand, Rød (*Lamium purpureum*): almindeligt markukrudt.

Valmue, Gærde (*Papaver dubium*)

Valmue, Korn (*Papaver rhoeas*)

Valmue, Kølle (*Papaver argemone*)

Vandstjerne, Fladfrugtet (*Callitriche platycarpa*): set et par steder ved søer og grøfter, sikkert almindeligt udbredt sådanne steder.

Vedbend, Almindelig (*Hedera helix*): plantet og forvildet.

Vejbred, Ager- (*Plantago major* ssp. *intermedia*): hyppigt markukrudt, især på vandlidende steder.

Vejbred, Glat (*Plantago major* ssp. *major*): almindelig.

Vejsennep, Finbladet (*Descurainia sophia*)

Vikke, Muse (*Vicia cracca*)

Vikke, Smalbladet (*Vicia angustifolia* var. *angustifolia*): hist og her i "vild" græsvegetation.

Vikke, Tofrøet (*Vicia hirsuta*).

Vintergæk, Almindelig (*Galanthus nivalis*): hist og her forvildegt i krat og skov.

Vinterkarse, Udspærret (*Barbarea vulgaris* ssp. *arcuata*)

Viol, Marts- (*Viola odorata*): alm. nær bebyggelse

Vorterod (*Ranunculus ficaria* ssp. *ficaria*): m. alm.

Ærenpris, Glat (*Veronica serpyllifolia*): i plæner, langs skovveje etc. Kulturbetinget.

Ærenpris, Krat- (*Veronica hederifolia* ssp. *lucorum*). alm. i frodig skov, i krat på havejord etc. i april-maj.

Ærenpris, Læge- (*Veronica officinalis*): surbundsplante som kun findes sparsomt i Saltsø Skov og i nåleplantningen øst for Julianehøj Skov.

Ærenpris, Mark- (*Veronica arvensis*): almindeligt markukrudt.

Ærenpris, Storkronet (*Veronica persica*): almindelig markukrudtsplante.

Ærenpris, Tveskægget (*Veronica chamaedrys*): almindelig i græsvegetation, især ved skove og i moser.

Ærenpris, Tykbladet (*Veronica beccabunga*): bemærket et par steder ved moser og vandhuller.

Åkande, Hvid (*Nymphaea alba* ssp. *alba*): I sø i 35.

Mosser:

Nogle få er noteret

Cypresmos, Almindelig (*Hypnum cupressiforme*): m. alm. på stengærderne og i skov.

Horntand, Rød (*Ceratodon purpureus*). M.alm. på stengærder, cement, sten etc.

Katrinemos, Bølget: m. alm. i skov.

Knopmos, Kær- (*Aulacomnium palustre*): i hængesækken i naturelement 35.

Kortkapsel, Fløjlsagtig (*Brachytecium velutinum*): alm. i skov.

Kortkapsel, Rubørstet (*Brachytecium rutabulum*): m.alm.

Næbmos, Fin (*Eurhynchium hians*): m. alm. i skov, på skråninger etc.

Silkemos, Kruset: m.alm. på stengærderne.

Snobørste, Almindelig (*Funaria hygrometrica*): m.alm. på nyryddet jord, også i skovlysninger etc.

Spydmos, Spids (*Calliergonella cuspidatum*): m. alm. i kær, og kan også vokse tørt langs skovveje etc. Kendes på de hårde, spidste skudspidser.

Tørvemos (*Sphagnum fallax*): er næsten enerådende tørvemos i hængesækken i naturelement 35.

Tørvemos, Udspærret (*Sphagnum squarrosum*): i randzonen til hængesækken i naturelement 35, desuden ved Saltsø og ude i søen (mosen) i Krogstrup Hegn.